

بسمه تعالی



معاونت پژوهشی

فرم پیام پژوهشی

عنوان طرح تحقیقاتی:	بررسی تأثیر ترکیب اکسیژن مکمل با غلظت های متفاوت و دارچین بر تهوع و استفراغ پس از عمل سزارین تحت بی حسی نخاعی
تاریخ خاتمه طرح :	۱۴۰۱/۰۶/۲۸

مجری یا محقق اصلی و همکاران با ذکر وابستگی هر فرد:

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	مرتبه علمی	کد ملی	تلفن همراه	eMail
محدثه بلوردی	کارشناسی ارشد	آمار زیستی	مری - Tutor	۳۰۷۱۸۶۲۵۸۱	۰۹۱۳۴۴۵۸۱۴۹	mbalvardi_biostat۹۰@yahoo.com
نجمه صادقی	دکتری PhD	فیزیولوژی	استادیار - Assistant Professor	۲۲۹۶۹۱۱۷۲۲	۰۹۰۱۲۹۳۵۶۵۲	najmehsa@yahoo.com
مریم فیروزآبادی	کارشناسی ارشد	مامایی	مری - Tutor	۳۰۷۱۲۰۷۴۵۱	۰۹۱۳۳۷۸۴۴۶۱	maryamfirouzabadi۲۳@gmail.com
محمد بختیاری	دکتری تخصصی بالینی	بیهوشی	استادیار - Assistant Professor	۳۱۳۰۶۷۲۴۵۱	۰۹۱۳۳۴۵۴۱۸۳	baran۳۱۳۰۶۷۲۴۵۱@gmail.com
فاطمه نسیمی	کارشناسی ارشد	پرستاری	مری - Tutor	۲۳۷۲۷۲۸۶۵۲	۰۹۱۷۱۲۵۹۳۳۵	nasimif@yahoo.com
زهرا عسکری	کارشناسی ارشد	پرستاری	مری - Tutor	۲۹۸۰۷۳۲۱۸۴	۰۹۹۰۵۹۶۸۱۶۰	askarii.sirums@gmail.com

۱- عنوان پیام پژوهشی (حداکثر ۲۰ کلمه):

تاثیر غلظت بالای اکسیژن به تنهایی و در ترکیب با روغن دارچین بر کاهش تهوع و استفراغ، بعد از عمل در بی حسی نخاعی

۲- پیام کلیدی (حداکثر ۸۰ کلمه): (Specific Objectives)

غلظت بالای اکسیژن به تنهایی و در ترکیب با روغن دارچین در طی ۶ ساعت اول پس از عمل جراحی نمی تواند باعث کاهش تهوع و استفراغ، در بی حسی نخاعی شود

۳- متن پیام پژوهشی (حداکثر ۲۴۰ کلمه):

• اهمیت موضوع (۵۰ کلمه)

تهوع و استفراغ بعد از عمل یکی از شایع ترین عوارض پس از بیهوشی است و باعث بروز ناراحتی در افراد مختلف می شود. علیرغم استفاده از داروها، همچنان تهوع و استفراغ پس از عمل به عنوان یک عارضه شایع باقی مانده است

• مهمترین نتایج طرح به زبان غیر تخصصی (۷۰ کلمه)

غلظت بالای اکسیژن به تنهایی و در ترکیب با روغن دارچین نمیتواند باعث کاهش تهوع و استفراغ، بعد از عمل سزارین تحت بیحسی نخاعی در طی ۶ ساعت اول شود و در صورت بروز تهوع و استفراغ شدید باید از داروهای شیمیایی نیز استفاده کرد.

• موارد کاربرد نتایج طرح (۸۰ کلمه)

کاهش تهوع و استفراغ در موارد عمل جراحی تحت بیحسی نخاعی

۴- تأثیرات و کاربردها:

•• تأثیر ۱: توضیح مختصر

در صورت بروز تهوع و استفراغ شدید بعد از عمل در بیهوشی نخاعی باید علاوه بر اکسیژن و دارچین از داروهای شیمیایی نیز استفاده کرد

•• تأثیر ۲: توضیح مختصر

۵- محدودیت‌های شواهد چه بودند؟

کم بودن حجم نمونه و پیگیری کوتاه مدت بیماران

۶- مخاطبان طرح پژوهشی:

متخصصین بیهوشی و کارشناسان اتاق عمل

۷- آیا این خبر می‌تواند از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، ارزش‌های دینی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته‌باشد؟

خیر

۸- در صورتی که این طرح منتج به مقاله شده است لینک مقاله درج شود:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S108947226001413?dgcid=author>

۹- منابع و مراجع : حداکثر چهار مرجع اصلی استفاده شده در طرح تحقیقاتی مورد نظر را ذکر نمایید

۱. Heidari SM, Hashemi SJ, Taghizadeh J. Evaluation and comparison of the effect of different intraoperative oxygen concentrations on reduction of nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy under general anesthesia. Journal of Isfahan Medical School. ۲۰۱۸; ۳۶(۴۸۶): ۷۳۱-۶.

Seidy J, Farhadifar F, Ghadami N, Zandvakili F, Roshani D, Taifoori L, et al. Effect of supplemental oxygen on the incidence and severity of nausea and vomiting in the patients after cesarean surgery under spinal anesthesia. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. ۲۰۱۰; ۱۵(۲): ۲۶-۳۵

Golfam W, Golfam P, Golfam B. The effect of excess oxygen in reducing nausea and vomiting after breast surgery. J Ilam Univ Med Sci. ۲۰۰۹; ۱۷: ۳۱-۵.

۳۳. Aliakbarzadeh Arani Z, Gilasi H, Khari Arani M, Shouri Bidgoli A, Asayesh H. The effect of oxygen therapy on postoperative nausea and vomiting. Nursing And Midwifery Journal. ۲۰۱۳;۱۱(۴):۰